



Ministerio de Salud
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente
Servicio de Urgencia CESFAM Bellavista de La Florida

DATO ATENCIÓN DE URGENCIA

C4-35449-2

Paciente: **17.111.330-K CHRISTOPHER HERNAN ALVAREZ ALVARADO**
DOLOR ABDOMINAL, NAUSEAS, VOMITO, PERDIDA DE APETITO
Fecha de Nacimiento: 19/09/89 Edad: 27 AÑOS

Admitido por: Elena Jorquera molina
PREVISION: FONASA B

Antecedentes del ingreso

Fecha y Hora de la Admisión: **05/JUN/2017**
Estado del Paciente al Ingreso

Accidente

Alergias: (-) medicamentos uso habitual: (-)

Lugar del Accidente:

Antecedentes de la Prestación de Urgencia

Signos Vitales

Nº	Hora	Pulso	Presión Arterial	Temperatura Axilar	Temperatura Rectal	Frecuencia Respiratorio	Saturación
1	10:45	72	121/75	37.8	-	-	98%

Examen De Ingreso

Antecedentes de Pre-Hospitalización
Indicaciones de la Observación:

DOLOR EN LA PARED ESTOMACAL

Examen Físico

Evolución del Paciente durante la Observación:

**PACIENTE SIN ANTC MORBIDOS, VOMITOS, NAUSEAS E INDICA INDIGESTION. PRESENTA LEVE SINTOMA DE FIEBRE .SE ENCUENTRA ORIENTADO
RITMO REGULAR 3 GOLPES PRESENTES SIN RUIDOS**

Antecedentes del Egreso

Fecha y hora del Egreso: **05/06/2017**
Estado del Paciente al Egreso: **Leve**

12:25

Reposo de 7 días
Referencia para el control:
Consultorio: LOS QUILLAYES

Hipótesis Diagnóstica:
**PRESENTA BACTERIA HELICOBACTER PYLORI (GASTRONTERITIS)
ESOMEPRAZOL (NEXIUM)**

Tratamiento

REPOSO

EVITAR CONSUMO DE ALCOHOL O ANTIINFLAMATORIOS

EN CASO DE CONTINUAR EL DOLOR CONSULTAR CON MEDICO POSIBLE ENDOSCOPIA

Receta Medicamentos:

OMEPRAZOL (PRILOSEC) 1 CADA 8 HORAS X 7 DIAS

CIMETIDINA (TAGAMED) 1 CADA 8 HORAS X 7 DIAS

Indicaciones al Alta:

Solicite una cita con el médico si los síntomas de gastritis persisten más de 2 o 3 días, si vomita sangre o tiene deposiciones con sangre.

Control en respectivo consultorio, reposo, indicación médica.

**URGENCIA
ADULTOS**

GUSTAVO DANIEL SANTANA AVILA
Firma y Timbre profesional

Los antecedentes contenidos en el presente informe corresponden a la Atención de Urgencia y deben entenderse como tales.
Estos pueden variar según la patología del Paciente y el cumplimiento de las recomendaciones aquí propuestas.