


Recomendaciones

Como terapeuta de la paciente, se recomienda a nivel académico tener flexibilidad a la hora de evaluarla, esto debido a que la forma de aprendizaje y expresión de la estudiante puede en ocasiones presentarse de forma atípica, como por ejemplo, siendo más concreta que abstracta, o facilitándose ciertos tipos de evaluaciones más que otras.

También, se recomienda manejar un tiempo adecuado de organización de pruebas y trabajos para que la estudiante pueda orientarse con antelación en relación a eso.

Cualquier duda comunicarse al correo abarbagelata@hcuch.cl

Atte.



Ps. Amanda Barbagelata
Clínica Psiquiátrica Universitaria
Universidad de Chile

INFORME

La psicóloga que suscribe certifica que la paciente Catalina Ignacia Soza Norambuena se encuentra cursando un proceso de psicoterapia en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Clínico de la Universidad de Chile desde hace aproximadamente un año.

La paciente actualmente presenta los siguientes diagnósticos;

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, presentación combinada. ya que presenta un patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad que interfiere con el funcionamiento de la paciente, con frecuencia falla en prestar la debida atención a detalles, por descuido se cometen errores en las tareas, dificultad para mantener la atención en tareas o actividades recreativas, con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente, no sigue las instrucciones y no termina las tareas, dificultad para organizarse, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido, pierde cosas necesarias para tareas o actividades, se distrae con facilidad por estímulos externos, junto a sintomatología de hiperactividad.

Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable, evidenciándose un patrón de inestabilidad en las relaciones interpersonales y una tendencia a actuar impulsivamente y sin considerar las consecuencias, con humor impredecible, arrebatos emocionales e incapacidad para controlar las explosiones conductuales.

También es importante señalar que la paciente presenta sintomatología que podría hablar de un trastorno del espectro autista (hipersensibilidad auditiva, dificultad para concentrarse, dificultad para entender las emociones o el humor en otras personas, escaso contacto visual), sin embargo, este diagnóstico no se ha confirmado.